

مراقبت پس از بیوپسی کلیه

1- کدام یک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟

-بیوپسی کلیه همان نمونه برداری سوزنی از بافت است

-مصرف پلاویکس و آسپرین در زمان نمونه برداری منعی ندارد

-مصرف داروهای فشارخون در زمان نمونه برداری منعی ندارد

-پس از بیوپسی کلیه، ادرار بیمار از نظر هماچوری کنترل میشود

۲- در رابطه با بیوپسی کلیه کدام مورد نادرست است؟

-تا ۴ ساعت در محل بیوپسی فشار کیسه شن لازم است

-به هیچ عنوان بعد از بیوپسی تا ۲۴ ساعت مایعات مصرف نکنید

-نیازی به استراحت مطلق پس از بیوپسی نمیباشد

-موارد ۲ و ۳

۳- خانم ۲۶ ساله بیوپسی کلیه انجام داده است کدام مورد برای ایشان معنی ندارد؟

-مصرف فراوان مایعات پس از دو ساعت

- فعالیت پس از ۲۴ ساعت

- هماچوری در چند روز اول پس از بیوپسی که به تدریج کم می شود

-همه موارد

۴- کدام مورد در رابطه با بیوپسی کلیه صحیح است؟

- منع مصرف آسپرین

- عدم خوابیدن به پهلو بعد از بیوپسی

-مراجعه به پزشک در صورت هماچوری شدید

-همه موارد